



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും
(പ്രാബല്യം: 2020 കെട്ടോബർ 24 മുതൽ ഒക്ടോബർ 28 വരെ)



കണ്ണൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പിലിക്കോട്-ഉം
ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയൂക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.എൽ.ആർ 85/2020

തീയതി: 23/10/2020

എ. പിന്നിട്ട നാല് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപോക്ഷിക ആർദ്ദത, %	കാറിഞ്ഞ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
107.0	30.5 – 33.0	23.2-25.7	78–95	00 -08

ബി. വരുന്ന അന്വേദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	24.10.2020	25.10.2020	26.10.2020	27.10.2020	28.10.2020
മഴ, മി.മീ	2	1	1	10	6
കുടിയ താപനില, °C	31	31	31	31	31
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	24	24	24	24	24
കുടിയ ആപോക്ഷിക ആർദ്ദത, %	95	95	95	95	95
കുറഞ്ഞ ആപോക്ഷിക ആർദ്ദത, %	75	75	75	75	75
കാറിഞ്ഞ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	10	12	12	12	12
കാറിഞ്ഞ ദിശ, ഡിഗ്രി	180	180	200	250	270
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	7	7	8	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫലം	പ്രധാനങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ	ഇന്ത്യാട്ടു കുടിയ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉച്ചതിനിന്ത്യുള്ള സമയങ്ങളിൽ പാടത്തു ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. കനുകകാലികളെ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മേയാൻ വിടരുത്.		
വാഴ	വിവിധഫലം	ഇലപുള്ളി രോഗം 	രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ വെട്ടി മാറ്റി തിയിട്ടു നശിപ്പിക്കുക. രോഗംകുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ശതമാനം ഭോർഡോമിഗ്രിതം ലിറ്ററിന് ഒരു മില്ലി പശ കുടി ചേർത്ത് തളിക്കുക. രോഗം അധികരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഫ്രാപിക്കാനോസാർ 25 EC ഒരു മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ നേർപ്പിച്ച് തളിക്കുക

കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	ചീച്ചൽ രോഗം 	മുൻകരുതലായി ടെട്ടക്കോഡർമ സന്ധുശ്ശമാക്കിയ വേപിൾ പിള്ളാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വിത്തം തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണമായി ചേർത്തിളക്കുക. രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ രേഖാമിൽ രണ്ടു ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മണ്ണ് കുതിർക്കുക. ഇലകളിൽ ചീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.
കുരുമുളക്	കായ്ക്കുന്ന സമയം	പൊള്ളു കീടവും രോഗവും 	മുൻകരുതലായി ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതത്തിൽ 2 മിലി കിഗ്രാംഫോസ് ചേർത്ത് തളിക്കുക. ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ ഫൈസ്റ്റകാണ്സോൾ ഒരു മിലി.-ഉം ദെൽറ്റാമെത്രിൻ അര മിലി.-ഉം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലായൻി തളിക്കുക
കശുമാവ്	പുതുതായി നട്ട തെതകൾ	തേയില കൊതുക്കും അനുബന്ധ പുഷ്ടൽ രോഗങ്ങളും 	മുൻകരുതലായി ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതത്തിൽ 2 മിലി കിഗ്രാംഫോസ് ചേർത്ത് തളിക്കുക. തളിരിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ ചീഞ്ഞു കാണുന്നുവെങ്കിൽ ഫൈസ്റ്റകാണ്സോൾ ഒരു മിലി.-ഉം മാലത്തിയോൺ രണ്ടു മിലി.-ഉം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലായൻി തളിക്കുക
വെള്ളം വർദ്ധിക്കുന്ന വിള	വളർച്ചാ ഘട്ടം	മൃദുരോമ പുപ്പൽ രോഗം 	വെള്ളത്രി വർദ്ധി വിളകളിൽ മൃദുരോമ പുപ്പൽ രോഗം പടരാൻ സാധ്യത. മുൻ കരുതലായി ‘മാക്കോ സെബ്സ്റ്റ്’ 2 ഗ്രാം ഒരു ലിനർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ തയ്യാറാക്കി ഇലകളുടെ ഇരു വരുത്തും തളിക്കുക. രോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ ‘അക്കോമിൻ’ 3 മിലി. ഒരു ലിനർ വെള്ളത്തിൽ എന അനുപാതത്തിൽ 15 ദിവസ ഇടവേളകളിൽ മുന്നു തവണ തളിക്കുക. രോഗബാധിത ഇലകൾ പറിച്ചുട്ടത് തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുക.
പാവയ്ക്ക്	വളർച്ചാ ഘട്ടം	ബാക്ടീരിയൽ വിൽറ്റ് 	കൃഷിയിടം വ്യത്തിയായി സുക്ഷിക്കുക. സംടെപ്പേരോസൈറ്റിൽ ഗുളിക രേഖണം 2ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ ചേർത്ത് തളിച്ച് കൊടുക്കുക.

കവുങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	ചീയൽ	<p>രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ വെട്ടി മാറ്റുക.അക്കോമീസ് 8മില്ലി 1ലി.വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ പശ ചേർത്ത് 25 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ രോഗം വരാതിരിക്കാനായി കൊണ്ടെന്നും 2ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക. കുമ്മായം 1കിഗ്രാം ഒരു കവുങ്ങിന് എന്ന തോതിൽ നൽകുക(മഴക്കാലത്തിനു മുൻപും ശ്രദ്ധവും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി 500 ഗ്രാം ഒരു കവുങ്ങിന് എന്ന തോതിൽ).</p>
---------	-------------	------	--

ഏപ്പ്/-

നോയൽ ഓഫീസർ

ഗാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി