



**കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല**  
**കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,**  
**ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനിക്കര**  
**Email: cohagmet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in**  
**കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ**



**ഒല്ലുകര ബോക്സ്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല**

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോട് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 43/2020(ഒ), വൈള്ളിയാഴ്ച

തീയതി 23.10.2020

**അടുത്ത 5 ദിവസത്തെക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:**

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	24.10.2020	25.10.2020	26.10.2020	27.10.2020	28.10.2020
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	1.3	0	0	0	7.3
ഉയർന്ന താപനില (°C)	33.3	33.7	34.1	34.6	35
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	23.1	22.5	22.2	23.1	25
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദേഹ (%)	94	93	98	93	97
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദേഹ (%)	59	57	54	46	52
കാറ്റിന്ത്യേരഗത്(കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	5	5	4	4	4
കാറ്റിന്ത്യേര ദിശ (ഡിഗ്രി)	248	248	101	248	293
മേഘവ്യാപ്തി (കെട്ട)	8	8	7	6	7
ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കെ.എ.യുവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ മഴ കുറയാൻ സാധ്യത.					

**കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:**

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ: മഴകുറയാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കീടനാശിനിപ്രയോഗവും, കാർഷികോൽപ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.		
സെല്ല് (മുണ്ടകൾ) ഞാറുപരുവം	ഓലപചുരുട്ടിപ്പുഴു	മുട്ടികെട്ടിയ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി തുടരുന്നതിനാൽ നെല്ലിൽ ഓലപചുരുട്ടിപ്പുഴുവിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഏക്കർ പാടങ്ങേബരത്തിന് 2 സിസി ദെടക്കോഗ്രാമ കാർബ് ചെറു കഷ്ണങ്ങളായി മുൻ്നിച്ചു വയലിന്റെ പലഭാഗത്ത് ഓലയുടെ അടിഭാഗത്തായി കൂത്തി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 2 മിലി കിന്നാർഫോസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു തളിക്കുക.
	കുഴൽപ്പുഴു	മഴക്കാലത്ത് നെൽപ്പുടാങ്ങളിൽ കുഴൽപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം കാണാനിടയുണ്ട്. വൈള്ളം വാർത്തയും കളഞ്ഞു ഒരു ഏക്കരിൽ 25 കി.ഗ്രാം അരക്കപ്പോടിയിലോ ഉമിയിലോ ഒരു ലിറ്റർ മണ്ണണ്ണു ചേർത്ത് പാടത്ത് വിതരുക.
വാഴ	നടീൽ പരുവം	വാഴ നടുന്ന സമയത്ത് ഒരോ വാഴക്കും 250 ഗ്രാം കുമ്മായം വീതം ഇടുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
കുരുമുളക്	ശ്രൂതവാടം	തുടർച്ചയായ മഴ മുലം കുരുമുളകിൽ ദ്രോവാട രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. പ്രതിരോധ നടപടിയായി മുന്ന് ഗ്രാം കോപ്പർ ഓക്സിഫോറോഡ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി ഓരോ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലും മണ്ണു കുതിരത്തക്ക വണ്ണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.
ജാതി	ഇലക്കൊഴിച്ചിൽ	ജാതിയിൽ ഇലക്കൊഴിച്ചിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായി ഒരു ശതമാനം വീരുമുള്ള വേപ്പേണ്ണ വൈള്ളത്തുള്ളി എമർഷൻ തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ലെക്കാനിസീലിയം ലെക്കാനി എന്ന മിത്രകുമിൾ 20ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ പത്തു ദിവസം ഇടവിട്ട് തളിക്കുക.
മുളക്	വൈള്ളിച്ച	മുളകിൽ വൈള്ളിച്ചയുടെ ആക്രമണം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 2 ശതമാനം വീരുമുള്ള വേപ്പേണ്ണ വൈള്ളത്തുള്ളി എമർഷൻ തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ലെക്കാനിസീലിയം ലെക്കാനി എന്ന മിത്രകുമിൾ 20ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ പത്തു ദിവസം ഇടവിട്ട് തളിക്കുക.
മുഗസംരക്ഷണം	കനുകാലികൾക്ക് നിത്യവും പച്ചപ്പുളിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക. വിറ്റാമിൻ ധാതുവാണ മിശ്രിതം നിർദ്ദിഷ്ട അളവിൽ നിന്തേന നൽകുക.	