



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനിക്കര
Email: cohagnet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ



തൃപ്പൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 17/2019(33), തിക്കളച്ച്

തീയതി 22.04.2019

കഴിഞ്ഞ ആർച്ചപ്രതിലെ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി: കഴിഞ്ഞ ആർച്ചപ്രതിലെ വൈള്ളാനിക്കരയിൽ 57.4 മി.മീ മഴ ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും ഉയർന്നതാപനില 34.8 മുതൽ 37.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാപനില 21.6 മുതൽ 26.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും, രാവിലെതെ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത 73 മുതൽ 99 ശതമാനം വരെയും, ഉച്ചതെ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത 47 മുതൽ 59 ശതമാനം വരെയും ആയിരുന്നു. കാറ്റിന്റെ വേഗത മൺിക്കൂറിൽ 1.2 മുതൽ 3.1 കിലോമീറ്ററും, സുരൂ പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ദിനം പ്രതി 4.0 മുതൽ 10.0 മൺിക്കൂറും, പാപ്പാപ്പീകരണം ദിനം പ്രതി 3.3 മുതൽ 5.7 മില്ലി.മീറ്റർ വരെയും ആയിരുന്നു.

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	23.04.2019	24.04.2019	25.04.2019	26.04.2019	27.04.2019
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	1	1	0.3	0.3	0
ഉയർന്ന താപനില (°C)	35	35	35	36	36
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	25	25	25	25	25
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	95	95	95	95	95
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	60	60	60	60	60
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ/മൺിക്കൂറ്)	8	8	7	7	3
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	270	270	270	250	270
മൊലവ്യാപ്തി (ഒക്ട)	8	8	7	7	3

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കെ.എ.യുവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ ദൃഢപ്പെട്ട സമലങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
തെങ്ങ്	-	അന്തരീക്ഷ ഉഷ്ണമാവ് കുടിയതിനാൽ തടങ്ങളിൽ ഇളർപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിനായി പച്ചയോ, ഉണങ്ങിയതോ ആയ ചകിരിയിൽ മുട്ടുനാൽ നല്ലതാണ്. തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിൽനിന്ന് മുന്മീറ്റർ അകലാതിൽ വരികൾക്കിടയിൽ ചാലുകൂരിയോ, ഓരോ തെങ്ങിന്റെ കടയ്ക്കപ്പെട്ടും തടിയിൽനിന്നും രണ്ടമീറ്റർ അകലാതിൽ വട്ടത്തിൽ ചാലുകെല്ലടുതോ, അതിൽ ചകിരി നിരത്തിയ ശേഷം മൺിട്ടുമുടാം. ചകിരിയുടെ കുഴിഞ്ഞ ഉൾഭാഗം മുകളിലേയ്ക്ക് വരെതകവീഡിയതിലാണ് ചകിരി ചാലുകളിൽ അടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനുമുകളിൽ മൺിട്ടുമുടാം. ചകിരി അടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം 5 മുതൽ 7 വർഷത്തേക്ക് നിലനിർക്കും. ചകിരിക്കുപകരം ചകിരിചേരാർ തെങ്ങാംനിന് 25കി.ഗ്രാം എന്നതോതിൽ ഓരോവർഷവും തടത്തിലിട്ടു മുട്ടുന്നതും ഇളർപ്പം സംരക്ഷിക്കാൻ ഉതകും.
വംശ	ഇലപുള്ളി രോഗം	ഈ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയിൽ വാഴയിൽ ഇലപുള്ളി രോഗം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 20 ഗ്രാം സ്പൂഡോമോണാസ് ഒരുലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കുളിർക്കെ തളിക്കുക.
പച്ചകരികൾ (വെണ്ട)	പച്ചതുള്ളൾ	അന്തരീക്ഷ ഉഷ്ണമാവ് കുടിയതിനാൽ വെണ്ടയിൽ പച്ചതുള്ളനെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ആർച്ചയിലോരിക്കൽ 2% വീരുമുള്ള വേപ്പെണ്ണവെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം തളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 20 ഗ്രാം ലക്കാനിസീലിയം ലക്കാനി ഒരു പിറ്റ് വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക.
മുഗസംരക്ഷണം	കനുകാലിതൊഴുത്തിൽ വായുസഞ്ചാരം കുട്ടുന്നതിന് വശങ്ങൾ തുറന്നുവയ്ക്കുന്നതിനും പറ്റുമെങ്കിൽ മേൽക്കൂരയുടെ ഉയരംകുട്ടുന്നതും നല്ലതാണ്. (സി.എ.എ.ഡി.ഇ.സി.സി.എസ്, കെ.വി.എ.എസ്.യു., മൺഡാം)	