



കേരളകാർഷികസർവ്വകലാശാല

കാർഷികകാലാവസ്ഥാശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം

ഹോർട്ടികൾച്ചറൽകോളേജ്,വെള്ളാനിക്കര

Email: cohagmet@kau.in&kauagmet@yahoo.co.in

കാർഷികകാലാവസ്ഥമനിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ



തൃശ്ശൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷിവകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോട് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 38/2018(75), ചൊമ്പുങ്ങൾ

തീയതി 18.09.2018

പ്രളയ ബാധിത മേഖലകളിൽ ഈ ബുള്ളറ്റിനിലെ കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രായോഗികമാണ്.

കഴിഞ്ഞ അഴച്ചപയിലെ അന്തരീക്ഷസ്പിന്റി:കഴിഞ്ഞ അഴച്ച വെള്ളാനിക്കരയിൽ 0.3 മി.മീ മഴ ലഭിച്ചു. എറ്റവും ഉയർന്നതാപനില 32.0 മുതൽ 32.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാപനില 21.6 മുതൽ 23.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും, രാവിലെന്തെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേറ്റ് 87 മുതൽ 96 ശതമാനം വരെയും, ഉച്ചതെന്തെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേറ്റ് 52 മുതൽ 75 ശതമാനം വരെയും ആയിരുന്നു. കാറ്റിന്റെ പേരു മൺിക്കൂറിൽ 0.4മുതൽ 1.8 കിലോമീറ്ററും, സൂര്യ പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ദിനം പ്രതി 0.2 മുതൽ 10.4 മൺിക്കൂറും, ബാഷ്പപീകരണം ദിനം പ്രതി 1.5 മുതൽ 4.2 മില്ലി.മീറ്റർ വരെയും ആയിരുന്നു.

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	19.09.2018	20.09.2018	21.09.2018	22.09.2018	23.09.2018
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	2	3	0	0	0
ഉയർന്ന താപനില (°C)	32.0	32.2	32.3	32.2	32.0
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	22.6	22.5	22.6	22.5	22.5
മോഖ്യപാർത്തി (കെട്ട)	7	7	6	6	6
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേറ്റ (%)	90	90	90	90	90
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേറ്റ(%)	60	60	60	60	60
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ/മൺിക്കൂറ്)	6	6	6	6	6
കാറ്റിന്റെഭിൽ (ഡിഗ്രി)	290	290	290	290	290

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവചനമനുസരിച്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ആദ്യ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ നേരിയ തോതിലുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയും ,പിനീടുള്ള മുന്നുദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത കുറവുമാണ്.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	വളർച്ചാവല്ലടം	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല്	പാലുറയ്ക്കുന്ന പരുപം	ബാക്കടീരിയൽ ഇല കരിച്ചിൽ	നെല്ലിലെ ബാക്കടീരിയൽ ഇല കരിച്ചിക്കിലിനുംകരുതലായി പച്ച ചാണകം 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തേരെയെന്തിൽ കലക്കി തെളിഞ്ഞെടുത്താണ്. ഫലാം സ്വീപ്പറോസൈസ്റ്റിൽ 20ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി തളിച്ചാൽ മഞ്ഞ രോഗത്തിനെ ഒരു പാഠി വരെ നിയന്ത്രിക്കാം.
തെങ്ങ്	-	വെള്ളിച്ച	തെങ്ങിലെ വെള്ളിച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കാനായി 2% വീരുമുള്ള വേപ്പുണ്ണ എമ്പർഷൻ തയ്യാറാക്കിയിലേക്ക് 20 ഗ്രാം ലൈക്കാനിസീലിയം എന്ന മിത്രശൂമിൾ ചേർത്ത് നന്നായി കലക്കി ഇലകളുടെ അടിവാസത്ത് പതിയത്തക്കവിധം തളിച്ചുകൊടുക്കുക.
കുരുമുളക്	-	ദ്രുതവാട്ടം	കുരുമുളകിൽ ദ്രുതവാട്ട് രോഗം കാണാനിടയും. ഒരു കിലോ ഭെടകേക്കാവരും 90 കിലോ ചാണകപ്പുടിയും 10 കിലോ വേപ്പിൻ പിള്ളാക്കുമായി കൂട്ടി കലർത്തി ആവശ്യത്തിന് ഇലപ്പും നിലവിൽക്കെത്തക്കെ വള്ളം ഒരു തിരുത്തേയ്ക്ക് വയ്ക്കുക. ഇല മിശ്രിതത്തിൽ നന്ന് 2.5 കിലോ വീതം ഓരോ കുരുമുളക് ചെടിക്ക് ചുവട്ടിലും ഇട്ടു കൊടുക്കുക. രോഗം കൂടുന്ന പക്ഷം 1% വീരുമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതമോ അല്ലെങ്കിൽ 20 ഗ്രാംസ്വൈഡോമാണാൻ എഞ്ചുറുന്നുണ്ടാക്കിയിൽ 2.5 ഗ്രാം കോപ്പർ ഓക്സിക്കോബൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്രാം കോപ്പർ ലൈഡോക്സിക്കോബൈഡ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് മണ്ണുകുത്തിരത്തക്കെ വള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെടിയിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
മുസാരംകഷണം	<ul style="list-style-type: none"> • എലിപ്പനിക്കും പരാദരോഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. • ശരീരത്തിലും ആകുന്ന മുറിവുകൾക്ക് അടിയന്തരം ശരം നൽകുകുക. • കനുകകാലിപ്പെട്ടും പരിസരവുംശുചിയായിസുകൾക്കുക. <p>(സി.എ.എ.ഡി.ഐ.ഐ.സി.സി.എൻ., കെ.വി.എ.എൻ.യു., മന്ത്രാളി)</p>		