



കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ബുള്ളറ്റിൻ കൊല്ലം ജില്ല



(മേഖലാ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വെള്ളായണി ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി വകുപ്പ് എന്നിവ സംയുക്തമായി നൽകുന്നത്)

\\14Ä: KLM-AAS-27/2019

X0¿ X11 : 02.04.2019

ASp⁻ 5 Zrhkt⁻ ; pÅ I menhØ [hN\w

	03/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	06/04/2019	07/04/2019
ag (anAnaðA)	1	0.6	0	0	0
I qSib Xmj \re (Unsk)	39	39	39	39	39
I pd ^a Xmj \re (Unsk)	24	24	24	24	24
taL hymj\Xn(HI n)	7	7	4	4	4
I qSib BA{ZX (%)	95	95	95	95	95
I pd ^a BA{ZX (%)	40	40	40	40	40
I masa thKX (I rtemaðA [Xn aWri qdnA)	6	8	10	12	8
I masa Zn (Ur(Kr)	180	140	140	180	230

ASp⁻ 5 Zrhkt⁻ ; pÅ I nAj n \At±i S Ä

hri Ä	hfÄ`mL«w	tcnKI rS Ä	I nAj n \At±i S Ä
s\Äv	hri shSp _u	.	നെൽ വയലുകൾ കൊയ്തു തീരുന്നു. കൊയ്തു കഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളിൽ പയർ വിത്ത് 60 കി.ലോ/ഹെക് വിതയ്ക്കുക
sXSv	-	തെങ്ങിൽ മച്ചിങ്ങ കൊഴിയൽ	ചൂടിന്റെ ആധിക്യം കാരണം തെങ്ങിൽ മച്ചിങ്ങ കൊഴിയുന്നു. നന തുടരുക. കണികാ ജലസേചന രീതി (30-തൊട്ടു 40 ലി/ദിവസവും/ തെങ്ങൊന്നിന് അവലംബിക്കുക
hmg	ഒക്ടോബർ നട്ടത്	വേരിൽ മീലിമുട്ട	ഇമിടാക്ലോപ്രേഡ് 1 മി.ലി/ലി ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക

മരച്ചീനി		മീലിമൂട്ട	ഇലകൾ കുരുടിപ്പ് വന്നതുപോലെ കാണപ്പെടും. മീലിമൂട്ടയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേപ്പെണ്ണ 30 മി.ലി /ലി സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തളിക്കുക. മഞ്ഞ കെണി (ആവണക്കണ്ണ തേച്ചത്) ചെടികളുടെ ഇടയിൽ വയ്ക്കുക
----------	--	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------