



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം, ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്,
വെള്ളാനിക്കര.

കാർഷിക നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ
(ടെലിഫോൺ:04872371931)

എറണാകുളം

E mail: kauagmet@yahoo.co.in, cohagmet@kau.in

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷിവകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ്29/15,വെള്ളിയാഴ്ച

തീയതി 17.07.2015

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	18.07.2015	19.07.2015	20.07.2015	21.07.2015	22.07.2015
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	40	45	31	49	41
ഉയർന്ന താപനില (°C)	30	30	30	30	30
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	24	24	24	24	24
മേഘവ്യാപ്തി (ക്ട)	8	8	8	8	8
കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	90	90	90	90	90
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	76	77	82	78	78
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ)	015	015	015	015	015
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	290	280	290	270	270

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വളർച്ച-പരിപാലന ഘട്ടം	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല് (ചിനപ്പുപൊട്ടുന്ന ഘട്ടം)	ഓലചുരുട്ടി	കൃനാൽഫോസ് 2 മി.ലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിക്കുക.
തെങ്ങ് (തടം തുറക്കൽ)	ചെമ്പൻ ചെല്ലി	കള്ളി, പൈനാപ്പിൾ എന്നിവ യീസ്റ്റ് ചേർത്ത് പുളിപ്പിച്ച് തെങ്ങിൻ തോട്ടിൽ വച്ച് ചെമ്പൻ ചെല്ലിയെ ആകർഷിക്കാം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കീടനാശിനി ചേർത്ത് തോട്ടത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന കീടങ്ങൾ ചത്തു വീഴും.
വാഴ (കുലവരാൻ തുടങ്ങി)	ഇലതീനിപ്പുഴു സിഗാടോക്ക രോഗം	ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാനായി 2 മി.ലി കിനാൽഫോസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിക്കുക. ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സാഫ് 2 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കുളിർക്കെ തളിക്കുക.
പച്ചക്കറികൾ (വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ)	കുരുടിപ്പ് എഫിഡുകൾ മണ്ഡരി	മുളകിൽ കുരുടിപ്പ് രോഗം കണ്ടാൽ 2% വീര്യമുള്ള വേപ്പെണ്ണ-വെളുത്തുള്ളി-സോപ്പ് മിശ്രിതം തളിക്കുക. രോഗം കൂടിയ അളവിൽ പ്രകടമായാൽ ഡൈമെത്തോയേറ്റ് 30 EC എന്ന കീടനാശിനി 1.5 മി.ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് ഇലകളുടെ അടിയിൽ പതിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സ്പ്രെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. എഫിഡുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായി 2 മി.ലി കിനാൽഫോസ് അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മി.ലി ഡൈമെത്തോയേറ്റ് 30 EC ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിക്കുക. ഒബറോൺ 0.75 മി.ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിക്കുക.