



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനിക്കര
Email: cohagmet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ



തൃശ്ശൂർജിലു ഹരിണാലക്ഷ്മേഖല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എസ് 20/2020(39),ചൊവ്വാഴ്ച

തീയതി 12.05.2020

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചപതിലെ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വൈള്ളാനികരയിൽ മഴ ലഭിച്ചില്ല. ഏറ്റവും ഉയർന്നതാപനില 33.9 മുതൽ 37.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഏറ്റവും കുറവെന്തതാപനില 24.1 മുതൽ 26.2 ഡിഗ്രിസെൽഷ്യസും, രാവിലതെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേത് 77 മുതൽ 92 ശതമാനം വരെയും, ഉച്ചതെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേത് 51 മുതൽ 70 ശതമാനം വരെയും ആയിരുന്നു. കാറ്റിന്റെ പേരം മണിക്കൂറിൽ 1.9 മുതൽ 2.6 കിലോമീറ്ററും, സുരൂ പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ദിനം പ്രതി 2.1 മുതൽ 9.0 മണിക്കൂറും, പാശ്ചപ്പീകരണം ദിനം പ്രതി 3.4 മുതൽ 5.2 മില്ലി.മീറ്റർ വരെയും ആയിരുന്നു.

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	13.05.2020	14.05.2020	15.05.2020	16.05.2020	17.05.2020
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	6	3	11	12	5
ഉയർന്ന താപനില (°C)	36	36	36	36	36
കുറവെന്ത താപനില (°C)	25	25	25	25	25
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേത (%)	86	86	86	86	86
കുറവെന്ത അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേത (%)	70	70	70	70	70
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂറ്)	12	10	10	10	8
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	250	270	270	290	270
മേഘവ്യാപ്തി (കൈട)	7	7	7	8	7

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കെ.എ.യുവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജീലിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഫയക്ക് സാധ്യത. വൈക്കോൽ,കൊപേ,അടയക്ക മുതലായവ മഴ നന്നാതെ സുക്ഷിക്കുക.മണ്ണിൽ ഇളർപ്പം നിലനിർത്താൻ പുതയിട്ടുക

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ: വിളകളെ രോഗകീടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, മുൻകരുതലായി ജൈവകീടരോഗ നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക.		
തെങ്ങ്	കൊന്ധപ്രശ്നചെല്ലി	തെങ്ങിന്റെ മണ്ഡ നന്നായി വ്യതിയാക്കിയ ശ്രേഷ്ഠം 250 ശ്രാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് തുല്യാഞ്ജവിൽ നേർത്തെ മണലുമായി (250 ശ്രാം) ചേർത്ത് കുന്നേപാലയുടെ ചുറ്റുമുള്ള രണ്ടോ മുന്നൊ ഇലക്കവിളുകളിൽ നന്നായി നിറക്കുക. വർഷത്തിൽ മുന്നു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് ആവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് (ജനുവരി,മെയ്,സെപ്റ്റംബർ,കെട്ടാബർ) അല്ലെങ്കിൽ നാവ്തലലിൻ/പാറുഗുളികകൾ 120 ശ്രാം (ഏഷ്യൻഡം 4 എണ്ണം)45 ദിവസത്തിലെബാറിക്കൽ കുന്നേപാലയുടെ ചുറ്റുമുള്ള രണ്ടോ മുന്നൊ ഇലക്കവിളുകളിൽ നേർത്തെ മണലോടുകൂടി മുടുകയും ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ വളം കുഴികളിൽ മെറ്റാറെസിയം അനേന്നേസാപ്പളിയേ (250 മി.ലി. മെറ്റാറെസിയം കൾച്ചർ+750 മി.ലി. വൈളം) തളിക്കുക.
ജാതി	ഇല പൊഴിച്ചിൽ	ജാതിയിൽ ഇലപൊഴിച്ചിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻകരുതലായി ഒരു ശതമാനം വീരുമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം കലക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
വാഴ	പിണ്ഡിപ്പുഴു	വാഴയിൽ പിണ്ഡിപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണത്തിന് മുൻകരുതലായി 50 ശ്രാം വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക് പൊടിച്ചത് ഇലക്കവിളുകളിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
ഇണച്ചി, മഞ്ഞാൾ	-	ഇണച്ചിയും മഞ്ഞാളും നടുന്ന സമയമാണ് മുട്ട ചീയൽ രോഗ തടയുന്നതിനായി വിത്തിണി 0.3% മാങ്കോസെബ്/സുംഭോമോണാസ് ലായനിയിൽ 30 മിനിറ്റ് മുക്കിവെച്ച ശ്രേഷ്ഠം നടുക്ക.
പച്ചകരികൾ	-	പച്ചകരികൾ നടുന്നോൾ മണ്ണിൽ സുംഭോമോണാസ് കൾച്ചർ ചേർക്കുന്നതു വഴി കുമിൾരോഗങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ തടയാവുന്നതാണ്

