

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനിക്കര
Email: cohagmet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in
പരീക്ഷണാടിസ്ഥാന ബ്ലോക്ക് തല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ

ഇൻഡിയൻ ഫോറം, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കുഴച്ചി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 52/2019(103), ചൊമ്പുച്ച

തീയതി 24.12.2019

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ അന്തരീക്ഷന്മാരി: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വൈള്ളാനികരെയിൽ മഴ ലഭിച്ചില്ല. ഏറ്റവും ഉയർന്നതാപനില 31.2 മുതൽ 32.9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാപനില 21.7 മുതൽ 23.3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും, രാവിലെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടെറ്റ 61 മുതൽ 78 ശതമാനം വരെയും, ഉച്ചതെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടെറ്റ 48 മുതൽ 57 ശതമാനം വരെയും ആയിരുന്നു. കാറിന്റെ പേരു മണിക്കൂറിൽ 6.2 മുതൽ 13.9 കിലോമീറ്ററും, സൃഷ്ട പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ദിനം പ്രതി 3.0 മുതൽ 9.5 മണിക്കൂറും, ബാഷ്പവീകരണം ദിനം പ്രതി 4.6 മുതൽ 6.3 മില്ലി.മീറ്റർ വരെയും ആയിരുന്നു.

അടുത്ത 5 ദിവസത്തോളം കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	25.12.2019	26.12.2019	27.12.2019	28.12.2019	29.12.2019
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	0	0	0	0	0
ഉയർന്ന താപനില (°C)	32	32	32	32	32
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	21	21	21	21	21
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടെറ്റ (%)	70	70	70	70	70
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടെറ്റ (%)	50	50	50	50	50
കാറിന്റെ വേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂറ്)	6	6	8	11	10
കാറിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	70	110	70	70	90
മോഖ്യാപ്തി (ഒക്ക്)	4	3	3	3	4

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കെ.എ.യൂവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ മഴ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും വരണ്ട അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി തുടരുന്നതിനാലും ആവശ്യജട്ടങ്ങളിൽ പിളകൾക്ക് നന്ന കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

പിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ: പിളകളെ രോഗകീടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, മുൻകരുതലായി ജൈവകീടരോഗ നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക.		
നെല്ല് (മുണ്ടകൾ) കത്തിരു വരുന്ന പരുവം	ഇലപ്പോൾ	നെല്ലിൽ ഇലപ്പോനിനെ കാണാൻ ഇടയുണ്ട്. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായി 3 മി.ലി ഇമിസിംഗ്കോഡിലീ 10 ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക.
	ബാക്ടീരിയൽ ഇല കരിച്ചിൽ	നെല്ലിൽ ബാക്ടീരിയ മൂലമുള്ള ഇല കരിച്ചിൽ പടരാതെ നിയന്ത്രിക്കാൻ 6 ശ്രാം സ്പെട്ടേറ്റോസെസ്ക്രിൻ 30 ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർക്കിൾ തളിക്കാവുന്നതാണ്.
വാഴ	മാണവണ്ണ	വാഴയിൽ മാണവണ്ണിൽ ഉപഭവം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻകരുതലായി വാഴക്കന്ന് നടുന്നതിന് മുൻപ് കന്നിന്റെ അടിഭാഗത്തിന് ചുറ്റും, ചെത്തി വുത്തിയാക്കി ചാണക ലായനിയും ചാരവും കലർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കി, മുഞ്ഞാ നാലോ ദിവസം വെയിലെത്തുവച്ചുണ്ടാക്കി നടുക. കുടാതെ വാഴക്കന്ന് ഓനിന് ഒരു കി.ഗ്രാം വേപ്പിൻസ്പീസ്സാക്ക് എന്ന തോതിൽ നടുവേശാർ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നല്കാം.
പച്ചക്കറികൾ (പയർ)	ഫൂസേരിയം മുലമുള്ള വാട്ട് രോഗം	പയറിൽ ഫൂസേരിയം മുലമുള്ള വാട്ട് രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 2 ശ്രാം ബാവിസ്റ്ററിൽ അലൈക്രിൽ 2 മി.ലി. കോൺട്രാഫ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ മല്ലു കുതിരത്തകവീഡിയം 15 ദിവസം ഇടവിട്ട് മാറിമാറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പുരുണ്ണമായും രോഗം ബാധിച്ച ചെടികൾ പറിച്ചു മാറി നശിപ്പിക്കുകയും, തടത്തിൽ ഒരു നൂളും ബീച്ചിങ്ങ് പാശർ പേരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
മുളക്	വൈള്ളിച്ച	മുളകിൽ വൈള്ളിച്ചയുടെ ആക്രമണം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 2 ശതമാനം വീറൈമുള്ള വൈപ്പേണ്ണ വൈള്ളത്തുള്ളി എമർഷൻ തളിക്കുക. അലൈക്രിൽ ലെക്കാനിസിലിയം ലെക്കാനി എന്ന മിത്രകുമിൾ 20ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ പത്തു ദിവസം ഇടവിട്ട് തളിക്കുക.
മുഗ്രസംരക്ഷണം	കനുകാലിതൊഴുത്തിൽ പറ്റുമെക്കിൽ മേൽക്കുരയ്ക്കും ഉയരംകൂടുതും നല്കാം. (CAADECCS , KVASU, മല്ലുത്തി))	വായുസംവാരം കുടുന്നതിന് വശങ്ങൾ തുറന്നുവയ്ക്കുന്നതിനും