



**കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും**  
(പ്രാബല്യം: 2020 ജനുവരി 20 മുതൽ ജനുവരി 24 വരെ)



## കണ്ണൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പിലിക്കോട്-ഉം  
ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുനരീതിക്കുന്നത്

വിളവുള്ളിന്റെ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.എൽ.ആർ 06/2021

തീയതി: 19/01/2021

### എ. പിന്നീടു അഞ്ചു ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർദ്ധത, %	കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
0.3	32.8 – 34.6	23.9-25.1	63–91	04 -10

### ബി. വരുന്ന അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	20.01.2021	21.01.2021	22.01.2021	23.01.2021	24.01.2021
മഴ, മി.മീ	0	0	0	0	0
കുടിയ താപനില, °C	34	34	34	34	34
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	24	24	24	24	24
കുടിയ ആപേക്ഷിക ആർദ്ധത, %	80	80	80	80	80
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർദ്ധത, %	50	50	50	50	50
കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	4	4	6	6	6
കാറ്റിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	360	360	360	340	360
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	1	1	0	1	4

### സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫലം	പ്രധാനങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ								
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ	<b>മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല.</b>	നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ പച്ചക്കരികളിൽ വാട (ബാക്കീരിയ, പുഷ്ട മുലമുള്ള) രോഗങ്ങൾ പടരുന്നതിന് അനുകൂലമാകും									
തെങ്ങ്	വിവിധ ഫലം	<p>കൊന്നൻ ചെല്ലി</p>  <table border="0"> <tr> <td>ഉയരം</td> <td>കുറഞ്ഞ</td> </tr> <tr> <td>തെങ്ങിനങ്ങൾ</td> <td>പൊതുവെ</td> </tr> <tr> <td>കുടുതൽ</td> <td>ആക്കമണം</td> </tr> <tr> <td>വിഡേയരാണ്</td> <td></td> </tr> </table>	ഉയരം	കുറഞ്ഞ	തെങ്ങിനങ്ങൾ	പൊതുവെ	കുടുതൽ	ആക്കമണം	വിഡേയരാണ്		<p>തെങ്ങിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുനിന്നും ചെല്ലിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ണുകളെ കുത്തിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക. ബോർഡോ കൂഫൻ് കോണ്ട് വണ്ണുകൾ തുരന്ന ദ്വാരം നിരക്കുന്നത് മുൻവിൽ കുടി ഉണ്ടായെങ്കാവുന്ന പുഷ്ട ബാധയെ തടയാൻ സഹായിക്കും.</p> <p>2. തെങ്ങിന്റെ മും വ്യതിയാക്കിയ ശേഷം 6 ശ്രാം ഫെർട്ടറ് (Ferterra) 250 ശ്രാം മണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിക്ഷേപിക്കുക. ഈ പരിചരണം 3 പ്രാവശ്യം -ജനുവരി, മെയ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യണമെന്നതാണ്.</p> <p>തോട്ടങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം അവലംബിക്കുക.</p>
ഉയരം	കുറഞ്ഞ										
തെങ്ങിനങ്ങൾ	പൊതുവെ										
കുടുതൽ	ആക്കമണം										
വിഡേയരാണ്											

പച്ചക്കറികൾ	വിവിധ ഘട്ടം	ബാക്കീരിയൽ വാട്ട് 	തടത്തിൽ ഷ്ടീച്ചിംഗ് പാസർ 25 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി തയ്യാറാക്കിയ ലായൻ കുതിർക്കുക . രണ്ട് ദിവസം കഴിത്തെ സർട്ടേഫോറേസ്റ്റിൽ 500 മീലിഗ്രാം പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഇലകളിൽ തളിക്കുക. വീണ്ടും രണ്ട് ദിവസത്തിനു ശേഷം രൈറ്റോലാർ 3ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തിയ ലായൻ തടത്തിൽ കുതിർക്കുക.
വെള്ളരി വർഗ വിളകൾ	വിവിധ ഘട്ടം	വെള്ളരി വർഗ വിളകളിൽ വൈററസ് രോഗം 	രോഗം വന്ന ചെടികൾ പരിചെടുത്ത് തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുക. രോഗം പരത്തുന്ന കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായി ദൈഹമെൻസ് തയ്യാറാണ് 1 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.
വഴുതന	വിവിധഘട്ടം	എപിലാക്ട് വണ്ട് 	എപിലാക്ട് വണ്ട് വണ്ടിന്റെ എല്ലാ വളർച്ചാഫുങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു കളയുക. വേദ്ധപ്പുള്ള വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം 20 മിലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി ഒഴിക്കുക. വേദ്ധപ്പുള്ള കുരു സത്ത് 5 ശതമാനം വീരുത്തിൽ കലക്കി ഒഴിക്കുക

ഒപ്പ്/-  
നോഡൽ ഓഫീസർ  
ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി