



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: 22.03.2023 മുതൽ 26.03.2023 വരെ)

കണ്ണൂർ ജില്ല



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുറത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.എൽ.ആർ 23/2023

തീയതി: 21/03/2023

എ. പിനിട നാ ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
0.0	34.0 – 35.0	22.7 – 26.0	69.8 – 84.2	00 – 04

ബി. വരുന്ന നാല് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	22-03-2023	23-03-2023	24-03-2023	25-03-2023	26-03-2023
മഴ, മി.മീ	0	0	0	0	0
കുടിയ താപനില, °C	36	37	37	37	37
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	25	24	24	24	24
കുടിയ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	84	84	84	84	84
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	56	56	56	56	56
കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	12	5	6	12	6
കാറ്റിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	320	320	320	320	320
മേല വിന്യാസം, ഒക്ടാ	3	3	6	6	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫലം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ			മഴയില്ല**
മഴയില്ല. പകൽസമയങ്ങളിൽ കുടിയ ഉള്ളാവും രാത്രികളിൽ കുറഞ്ഞ താപനിലയും ആകാശം ഭാഗികമായോ മുഴുവനായോ മേഖാവൃതമായിരിക്കും . വായു ഇന്റപം കുറഞ്ഞു വരണ്ടതായിരിക്കും			
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ			അന്വേഷണ വാഴ്ചയും താങ്കുകൾ നൽകുക. വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ:- 1) വിളകളുടെ തട്ടതിൽ പുതയിടുക. 2) സാധ്യമായിട്ടുളിലോകക കണ്ണിക ജലസേചന രീതി അവലംബിക്കുക. 3) പകൽ 12 മണിയ്ക്കും 3 മണിയ്ക്കും ഇടയിൽ കാർഷിക വ്യത്തികൾ ഒഴിവാക്കുക. 4) നന്ദിയില്ലാത്ത വിളകൾക്ക് രാസവളങ്ങൾ, കോഴിവളങ്ങൾ എന്നിവ വിതമായി മാത്രം പ്രയോഗിക്കുക. 5) വിളകളുടെ തട്ടയിൽ കുമ്മായം പുശരുക

		<p>6) സർപ്പേദ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് അഞ്ച് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ പതിനഞ്ചു ദിവസ ഇടവേളകളിൽ ഇലകളിൽ തളിക്കുക</p> <p>7) വിളകളുടെ തടത്തിൽ വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യു നിലനിർത്താൻ ശേഷിയുള്ള മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ്/ചകിരിചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് വിതരുക.</p> <p>ഇന്ത്യപ്പെട്ട നഷ്ടം കുറക്കാനായ് മണ്ണിനു പുതയിടുക .കീട-രോഗ ബാധയില്ലാത്ത വിളകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ പച്ചിലകളോ കർണ്ണിലകളോ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. തന്ത്രം വിളകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് പുതയിൽ പ്രസ്തുത വിളയെ ബാധിക്കുന്ന കീട രോഗങ്ങളുടെ പ്രജനനം പ്രജനനം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായകരമാകും .മേൽമണ്ണ് ഇളക്കി പൊടിച്ചു നിയന്ത്രണായി പരത്തിയിടുന്നത് പുതയിടുന്നതിനു സമാനമായ ഒരു രീതിയാണ്. ഇത് മണ്ണിലെ ഇന്ത്യപ്പെട്ട നഷ്ടം തടയാൻ സഹായിക്കും.</p> <p>പ്രായം കുറഞ്ഞ വൃക്ഷ വിളകൾ, തൈകൾ എന്നിവയെ നേരിട്ടുള്ള സുര്യ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നും മടഞ്ഞ ഓലകളാൽ ആവരണം ചെയ്യു സംരക്ഷിക്കുക.</p> <p>നിർജ്ജലീകരണം തടയാനായി പക്ഷികൾക്കും കനുകാലികൾക്കും പകൽ സമയം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ നൽകുക. . പാർപ്പിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ അവയുടെ ദേഹത്ത് ഇടയ്ക്കിട വെള്ളം തുവുകയും വരഞ്ഞിൽ നിന്ന് ഫാൻ പലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.</p>	
വിവിധ വിളകൾ	വിവിധ ഘട്ടം	<p>നീരുറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ</p>  <p>നിലവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വരണ്ട കാലാവസ്ഥ മുണ്ടെ, തുള്ളൻ, മണംരി, ചാഴി, വെള്ളിച്ചു, മീലിമുട്ട് മുതലായ നീരുറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയാണ്. വികവെയും മൊരൈസക് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസിനെ പരത്തുന്നവയാണ്</p>	<p>5 മില്ലി വേപ്പെഡ്രൂ 1 ലിറ്ററിന് 5 ഗ്രാം വീതു സോപ് ലയിപ്പിച്ച ഇളം ചുടുള്ള ലായനിയിൽ ചേർത്തിളക്കി തയ്യാറാക്കിയ കീടനാശിനി തളിക്കുക</p> <p>അഛ്യകിൽ മാലതിയേയാണ് 50 EC രണ്ടു മില്ലി നാല് മില്ലി വേപ്പെഡ്രൂയേയാടാപം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയ കീടനാശിനി തളിക്കുക.</p>
വാഫ	നടുന്ന സമയം	വാഴക്കന്നിൽ കൂടി പടരുന്ന (കൊക്കാൻ, മുരടിപ്പ്, പനാമ വാട്ടം മുതലായ) രോഗങ്ങൾ	രോഗം വരുന്നത് തടയാൻ ക്യൂഷിയിടങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ണു രോഗ ബാധയെന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം വാഴക്കന്നുകൾ ശേഖരിക്കുക

വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം	തടങ്കുരപ്പൻ വണ്ണ് 	കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ശുചിത്വം പാലിക്കുക. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ (cadaver) 4 എണ്ണം വിതം വാഴകളുടെ മധ്യ നിരയിലുള്ള ഹ്രദയവിളുകളിൽ, നടുകൾിന്തു അഞ്ചാമത്തെത്തയും ആറാമത്തെത്തയും മാസങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. കഡാവർ (cadaver) ലഭിക്കാൻ കണ്ണാറയിലുള്ള വാഴ ശവോഷണ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഫോൺ: 9605758722
വഴുതിന	കായ്ക്കുന്ന ഘട്ടം	കായ്/തണ്ണു തുരപ്പൻ 	കീടബാധ കണ്ണാലുടൻ തണ്ണുകളുടെ അഗ്രഭാഗം വണ്ണ് തുരന്ന ആരത്തിന് 3 സെന്റീമീറ്റർ താഴെ വച്ച് മുറിച്ചു കളയുക. സാധ്യമായതെത്തയും കായകൾ പറിച്ചു മാറ്റിയതിനു ശേഷം ക്ലോറാണ്ടാനിലിപ്രോശ് (കോരാജൻ®) മുന്നു മീറ്റ് പത്തു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തണ്ണുകളിൽ പുർണ്ണമായും വീഴ്തക്ക വിധം തളിക്കുക തളിക്കുക. കീട നാശിനി തളി ചൂതിനു ശേഷം രൊഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അടുത്ത വിളവെടുപ്പ് നടത്തുക
വെണ്ണ	വിവിധ ഘട്ടം	തണ്ണുതുരപ്പൻ 	സാധ്യമായതെത്തയും കായകൾ പറിച്ചു മാറ്റിയതിനു ശേഷം ക്ലോറാണ്ടാനിലിപ്രോശ് (കോരാജൻ®) മുന്നു മീറ്റ് പത്തു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തണ്ണുകളിൽ പുർണ്ണമായും വീഴ്തക്ക വിധം തളിക്കുക തളിക്കുക. കീട നാശിനി തളി ചൂതിനു ശേഷം രൊഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അടുത്ത വിളവെടുപ്പ് നടത്തുക.
കോഴികളും വളർത്തു പക്ഷികളും	വിവിധ ഘട്ടം	വേനൽക്കാലപിരിമുറുക്കണ്ണ ഇരും രോഗങ്ങളും : 	അന്തരീക്ഷ ഉള്ളാവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് വളർത്തു കോഴികളെയും പക്ഷികളെയും പ്രതികുലമായി ബാധിക്കും. പ്രതികുല സാഹചര്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി പക്ഷികളെ സുരക്ഷിക്കൽ ഏൽക്കാത്ത വെള്ള പെയിന്റ് അടിച്ച മേൽക്കൂരകൾക്ക് താഴെ പാർപ്പിക്കുക. ഫോൺ, ദേഹത്തു തണ്ണുത്ത വെള്ളം തുവുക എന്നിവ അവലംബിക്കുക. കുടിക്കാനായി ഒരു സെറ്റ്, ലൂക്കോസ്, ഒരു ശതമാനം സോഡിയം റൈറ്റേറുകൾ എന്നിവ ചേർത്തു വെള്ളം നൽകുക. ചുട്ട് കുറഞ്ഞ രാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും വിറ്റാമിനുകൾ, ഫോസ്ഫോറസ്, വൈറ്റ്മിൻ - സി എന്നിവ സന്പൂഷ്മാക്കിയ തീറ്റ് നൽകുക

മൂല സംരക്ഷണം	വിവിധ എടട്ട്	<p style="text-align: center;"><u>അതേയാഴ്ചമാവ്</u></p>  <p>അന്തർക്കശ ഉള്ളശാഖ അഡിക്കമാവുന്നേബാൾ കൂടുതലായി അനുഭവാപ്പെടുന്ന ചുട്ട് പുറന്തള്ളാൻ കഴിയാതെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നത് വഴി മുഗങ്ങളുടെ ശരീരം താപസമർദ്ദം (heat stress)-ന് അടിശ്വെടുന്നു. പശുകളിൽ അമിത താപസമർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നോശ ഉണ്ടാകുന്നീർ ധാരാളമായി പുറന്തള്ളും. പശുകളുടെ സ്വാഭാവിക ദഹന വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുക, തുടർന്ന് തീരുത്തുക്കൽ കുറയുക, പ്രത്യുല്പന്നന വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുക, മരിച്ചക്കെത്തയും ഗർഭ ധാരണക്കെത്തയും ബാധിക്കുക, ഉൽപ്പാദനം കുറയുക, പാലിൽ കൊഴുപ്പിൽ അളവ് കുറയുക എന്നിവയുള്ള കാരണമായി തീരുക്കയും ചെയ്യും .</p>	<p>തൊഴുത്തിന്റെ മേൽക്കുര സാമാന്യം ഉയരത്തിൽ ആയിരിക്കണം. തൊഴുത്തിൽ ധാരാളം വായു സഞ്ചാരമുണ്ടായിരിക്കണം ഇടുങ്ങിയ, വായു സഞ്ചാരമുണ്ടാതെ ഉയരംകുറഞ്ഞ കോൺകീറ്റ്, ഓട് ഷീറ്റ് എന്നീ മേൽക്കുരകളോട് കൂടിയ തൊഴുത്തു/കുട്ട് മുഴുവൻ മരച്ച തൊഴുത്തുകൾ/കുട്ടകൾ എന്നിവ പുർണ്ണമായും ഒഴിവാകണം. തൊഴുത്തിന് ചുറ്റും തന്നെപ്പുകഴഞ്ഞാണെങ്കിൽ ചുട്ട് കുറക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.</p> <p>തൊഴുത്തുകളിൽ ഫാൻ വച്ചുകൊടുക്കാം. സിലിംഗ് ഫാനുകളുകൾ ഗുണം ചെയ്യുക ചുമർത്തി പിടിപ്പിക്കാവുന്ന ഫാനുകളാണ്.</p> <p>ധാരാളം ശുദ്ധ ജലം എപ്പോഴും കൂടിക്കാൻ ലഭ്യമാകണം. ശരീര ഭാരതത്തിന്റെ 60 ശതമാനത്തിലധികം ജലാംശമാണെന്നതും പാലിൽ ജലാശം 80 ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നതും മരക്കാതിരിക്കുക.</p> <p>എലുപ്പം ദഹിക്കുന്ന വരാഹാരത്തിന്റെ അളവു കൂടുക. ഇതോടൊപ്പം സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, സിക്ക്, മാംഗനീസ്, കോപ്പൾ എന്നിവ അടങ്കിയ ധാതുവാസം മിശ്രിതം കൂടി നൽകുക. ദിവസത്തിൽ ചുട്ടുകൂട്ടുതലുള്ള സമയങ്ങളിൽ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.</p> <p>പകൽ സമയങ്ങളിൽ, തൊഴുത്തിന് വെളിയിലാണെങ്കിൽ, മുഗങ്ങളെ തന്നെ മരഞ്ഞളുടെ ചുവട്ടിൽ നിർത്തുകുക.</p>
കറവ പശുകൾ	വിവിധ എടട്ട്	<p style="text-align: center;"><u>ചർമ്മ മുഴ രോഗം</u></p> 	<p>അടുത്തുള്ള മുഗശുപ്രതിയിൽ നിന്നും വാക്സിൻ നൽകുക. തൊഴുത്തും പരിസരവും ശുചിയായി സുക്ഷിക്കുക.</p> <p>രോഗഹേതുവായ വൈറസിൽ നിന്നും മുഗങ്ങൾ പുർണ്ണമായും മുക്കി നേടിയാൽ തന്നെയും ചർമ്മത്തിൽ രൂപം പ്രാപിച്ച മുഴകൾ ഉണ്ടാക്കിരുന്നേക്കാം. പൊട്ടി ലെഡിക്കുന്ന ഇത്തരം മുഴകൾക്കു കുറും പാണൽ (കൂട്ടി പാണൽ, കുർമ്മാണ എന്നിങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്) - നീളും ഇല മെത്തളുമായി ചേർത്തരച്ചു വെളിച്ചെന്നുയിൽ പാലിച്ച പാനൽ പുരട്ടുന്നത് ഫലപ്രദമാണെന്ന് കാണുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ചാന്ത് രൂപത്തിലുള്ള മരുന്ന് ദിവസവും കൂളിപ്പിച്ചതിനുശേഷം മുറിവിൽ പുരട്ടുക. മുറിവുകൾ പുർണ്ണമായും മാറുന്നത് വരെ ഇത് തുടരുണ്ട്.</p>

**മു അപായ വർഷി സുചന (ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായ്)

താക്കീൽ (ഉടൻ നടപടിയെടുക്കുക)	ജാഗ്രത (തയ്യാറാവുക)	ശൈല (കാത്രോർക്കുക)	നിസ്സാരം (നടപടികൾ ആവശ്യമില്ല)
--	-------------------------------	------------------------------	---

ഒപ്പ്/-
സോഡി ഓഫീസർ
ശാമീൻ കൃഷ്ണ കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി