



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ് കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: 28.08.2024 മുതൽ 01.09.2024 വരെ)



കണ്ടുരജിപ്പ്

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക റവേഷണ കേന്ദ്രം
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് സംയുക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിന്നന്പര്: പിലിക്കോട്/കെ.എൽ.ആർ - 69/2024

തീയതി: 27/08/2024

എ.പിനിട അഞ്ച് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഡ്ര, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
53.4	31.5 – 32.4	24.5 – 26.6	80 – 95	02 – 06

ബി.വരുന നാല്പിംഗിവസങ്ങളിലേക്കുള്ളകാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	28-08-2024	29-08-2024	30-08-2024	31-08-2024	01-09-2024
ശരാശരിമഴ, മി.മീ	10	8	15	12	7
കുടിയതാപനില, °C	31	31	31	31	31
കുറഞ്ഞതാപനില, °C	25	25	25	25	25
കുടിയആപേക്ഷിക ആർഡ്ര, %	95	95	95	95	95
കുറഞ്ഞആപേക്ഷിക ആർഡ്ര, %	80	80	80	80	80
കാറിന്റെവേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	6	6	8	14	8
കാറിന്റെവീഡിം, ഡിഗ്രി	270	250	250	270	340
മേഘവിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	8	8	8	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫെഡം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷികനിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ			രുപൈട ശക്തിയായ മഴ **
ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഡ്ര അനുഭവപ്പെടും. ആകാശം പുർണ്ണമായും മേഘാവൃതമായിരിക്കും. അന്തരീക്ഷ ഉള്ളാവ് സ്വാധാരണയിൽ കുറവായിരിക്കും. ആഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ 31 രുപൈട ശക്തിയായ മഴ (ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമുതൽ 115.5 മില്ലി വരെ)			

	<p>കഴിയെന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ശൈത്യമായ മഴയിൽ അമീതമായി വെള്ളരക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നീർ വാർച്ച അനുവദിക്കുക</p> <p>വിത്ത്, റബ്ബർ, കശുവണ്ടി, മത്തസൾ, കൊപ്പ ഉല്പന്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വെയില്ലത്തിട്ടുണ്ടുക.</p> <p>മുട്ടു കാണ്ടായ വാഴ, പച്ചക്കുറികൾ, താങ്ങുകൾ ആവശ്യമുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശൈത്യമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക.</p> <p>പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ</p> <p>വളം, വിത്ത്, കാലിത്തറിറ്റകൾ എന്നിവ ഇഞ്ചിപ്പം തട്ടാത്തതും കീടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ മുൻകളിൽ ഉയർത്തിക്കട്ടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മേൽ സുക്ഷിക്കുക.</p> <p>കനുകാലികളെ ബലക്ഷയമുള്ള തൊഴുത്തുകളിൽ പാർപ്പിക്കരുത്.</p> <p>ഉരുൾപൊട്ടലിനും, മണ്ണിട്ടിച്ചിലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ അടുത്തുള്ള സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തെക്ക് മാറാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p> <p>അവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മഴയില്ലാത്ത ഇടവേളകൾ ലഭിക്കുന്നോൾ മാത്രം പശ ചേർത്തു കീടനാശിനി തളിക്കുക.</p>			
നെല്ല്	വിവിധ ഘട്ടം	കരിച്ചുത്ത്/ചീച്ചുത്ത് രോഗം	മുൻകരുതലായി സ്ഥിച്ചിട്ട് പയഡർ (എക്സിന് 2 കിലോ) സുഷിരങ്ങളുള്ള കിഴികളിലാക്കി വെള്ളം കണ്ടതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക	
നെല്ല്	വിവിധ ഘട്ടം	ഓലചുരുട്ടിപുഴു 	ഓലചുരുട്ടിപുഴു ആക്രമണം ഉണ്ടാക്കിയിൽക്കൂടുള്ളുള്ളക്കവു വലിച്ചും ഓലചുരുട്ടിപുഴുകൾ തുറക്കുക.	ആക്രമണംരൂക്ഷമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഐഡ്യോസിലെവാൻ രൈഡർ 9.35% SC @1 മില്ലി/10ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്നതോതിൽ കലർത്തിയിൽക്കൂടുക.
തെങ്ങ്/	തെതകൾ	വെള്ളം കെട്ടികിടക്കുന്ന അവസ്ഥ/കുന്പു ചീയൽ	തെതകുഴികളിൽ അനുവദിക്കരുത്.	വെള്ളം കെട്ടികിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. കുഴികളിലേക്കു വെള്ളം ഒലിച്ചിരഞ്ഞാൽ കുഴികൾ ചുറ്റും വരവ് നിർദ്ദേശിക്കുക.
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	കുന്പു ചീയൽ 	മഴയുടെ ഇടവേളയിൽ 1 % ബോർഡോൾ്ഡ് മിശ്രിതം ഇലകളിലും കുന്പിലും പശ ചേർത്ത് തളിക്കുക.	കുന്പുചീയൽ ഉണ്ടായാൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രോഗം ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ചെത്തിമാറ്റി നശിപ്പിക്കുകയും മുൻവിൽ ബോധോ കുഴികൾ പുരട്ടുകയും ചെയ്യുക. തുടർന്ന് പുതുനാമ്പും വരുന്നത് വരെ കുന്പിനെ രൂപ പൂറ്റിക്കൊണ്ട് കുഴികൾ കുറുത്തായി ചുരുക്കിയാണെന്നു പൊതിഞ്ഞു മഴ വെള്ളം ഇരജാതെ സംരക്ഷിക്കുക. സമീപത്തുള്ള തെങ്ങുകളുടെ കുരുത്തോലകൾ ചുറ്റുമുള്ള ലെക്കവിളുകളിലും രൂപ ശത്രമാനം വീരുമുള്ള ബോധോ മിശ്രിതം തളിക്കുക. ദുർബല മേഖലകളിൽ, തെങ്ങുകളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്താൻ സുക്ഷ്മ മുലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്ര പോഷക മുലക പരിപാലനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കുരുമുളക്ക്	വിവിധ ഘട്ടം	പീച്ചൽ രോഗം	<p>പീച്ചൽ രോഗം : മുൻകരുതലായി തെടക്കേബാധികൾ സന്പുഷ്ടമാക്കിയ വേപ്പിൻ പിള്ളാകൾ-ചാണക മിശ്രിതം 150 ശ്രാം വിത്തം തടത്തിൽ വിതറി മഴുമായി ചേർത്തിളക്കുക.</p> <p>രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ണു തുടങ്ങിയാൽ രൈഡേ ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മഴുകുതിർക്കുക.</p> <p>ഇലകളിൽ പീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതെ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.</p>
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം (നേന്ത്രൻ വാഴ)	ഇലത്തിനി പുഴു	<p>രൈജവ കീടനാശിനികളായ ശ്രേയ, നന്ന തുടങ്ങിയവ 10 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇലകളുടെ രണ്ടുവശത്തുമായി തളിക്കണം.</p> <p>കീടനാശിനി 20 ഇസി (2-4 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) തളിക്കുക.</p> <p>എണ്ണബെബന്ധിയമെല്ലാം 39.35 SC (2 മില്ലി, 10 ലിറ്റർ വെള്ളം) തളിക്കുക.</p>
ഹണ്ണി	വിവിധ ഘട്ടം	വാട്ടം	<p>രു സെസ്റ്റിന് മുന്നുകിലോ വീതം കുമ്മായം മഴുകുതിർക്കുക. തെടക്കേബാധികൾ, സപുദ്ധേബാധികൾ എന്നി ജീവാണുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.</p> <p>രോഗം വന്ന ചെടികൾ പിചുതുമാട്ടി രുശത്താനും വീര്യമുള്ള വോദേബാധികൾ കൊണ്ട് തടം കുതിർക്കുക.</p>
വെണ്ട	വിവിധ ഘട്ടം	തണ്ടുതുരപ്പൻ	<p>വേപ്പിന്റെ മിശ്രിതം 5 ശതമാനം 15 ഓ 20 ദിവസം ഇടവേളകളിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുക. അഞ്ചുക്കിൽ കീടനാശിനി 2 മില്ലി ഒരു 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക.</p>
വിളകളും വളർത്തു മുഖങ്ങളും	വിവിധ ഘട്ടം	ആഫ്രീകൻ ചെച്ച്	<p>ചെച്ചുകളെ ആകർഷിച്ചു പിടിക്കുവാനായി രൈഡുനേന്നരങ്ങളിൽ നന്നന്ത ചണ ചാകുകളിൽ കാബേജ്ജ്, കോളിഫ്ലവർ, പപ്പായ എന്നിവയുടെ ഇലകൾ നിറച്ചു വീടിനു ചുറ്റും വെക്കുക. ഇവയിൽ വനിരിക്കുന്ന ചെച്ചുകളെ 200 ശ്രാം ഉപ്പു രുചിയിൽ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തയ്യാറാക്കിയ ലായനിയിൽ ഇടു നശിപ്പിക്കുക.</p> <p>വിളകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെച്ചുകളെ നശിപ്പിക്കാനായി 0.3 ശതമാനം വീര്യമുള്ള തുരിശ് (3 ശ്രാം കോപ്പർ സർഫേസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) ലായനി തളിക്കുക. തുരിശ് ലായനിയുടെ വീര്യം യാതൊരു കാരണവശാലും അധികരിക്കുന്നത്. അധികാരിച്ചാൽ വിളകൾക്ക് പൊള്ളുലും കഷിനൊവും ഉണ്ടാകും.</p>

പ്രശ്ന	വിവിധാല്പം	<p>പാറ, വായ് രോഗം</p>  	<p>അപ്പത്തോവെറിസ് അണുബാധ മുലമുണ്ടാകുന്ന വളരെയെറെ പകരുന്ന രോഗമാണ് കാൽ, വായ് രോഗം. അണുബാധയുടെ ഫലമായി വായിലും ചുറ്റുപാടും കാലുകളിലും വെസിക്കുലാർ നിവേദ ഉണ്ടാകുന്നു, അതിൻ്റെ ഫലമായി രു മുഗം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ നീങ്ങാനോ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു.</p> <p>പ്രതിരോധം: വ്യക്തിഗത മുഗങ്ങൾക്കും അവയുടെ പാർഷിട്ടത്തിനും ചുറ്റുപാടുകൾക്കും ശുചിത്വ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക. ഹൈത്തൽ ദോണിക്കുകൾ അടങ്ങിയ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുകളും അടങ്ങിയ തീറ്റകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് കനുകാലികളുടെ പ്രതിരോധങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. രോഗം വന്നാൽ ഉടൻ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മരുന്ന് നൽകുക.</p>
കോഴി/ താറാവ്	വിവിധ അല്പം	അണുബാധ	<p>കുടുകളുടെ തരയിൽ ഇളർപ്പം നിലനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇളർപ്പം നിലനിന്നാൽ തരയിൽ വീഴുന്ന കാഷ്ടത്തിൽ നിന്നും അമോൺ വാതകം പുരോത്തേക്കു വർദ്ധിക്കും.. അത് കോഴികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ പ്രതികുലമായി ബാധിക്കും.</p>

ഒപ്പ്/-
 നോസൽ ഓഫീസർ
 ഗ്രാമീണ കൃഷികാലാവസ്ഥാസേവപദ്ധതി

**മഴ അപായവർഷ്ണ സുചന (ആരെന്നിവാരണത്തിനായ്)

താക്കിൽ (ഉടൻടപ്പിയെടുക്കുക)	ജാഗ്രത (തയ്യാറാവുക)	ശ്രദ്ധ (കാതോർക്കുക)	നിസ്വാരം (ടപടികൾആവശ്യമില്ല)
--------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------