

कालावस्था मुनियिप्पुम् कार्षिक निर्देशणात्मक
(प्रावेल्यः 01.12.2021 मुत्तः 05.12.2021 वरे)



कल्पुर जीव

केरल कार्षिक संर्वकलाशाल प्रावेशिक कार्षिक गवेषणा केंद्र पीलीकोड़ा
 उत्तर कालावस्था वकुप्पुम् संयुक्तमायि पुराततीक्कुन्नत

बुद्धिमत्ता नमः: पीलीकोड़ा/के.प्र.उ.अ. 96/2021	तिथि: 30/11/2021
--	------------------

ए. पीनीट अनें त्रिवसनत्त कालावस्था

मध, मी.मी	कुटीय तापमात्रा, °C	कुरत्त तापमात्रा, °C	अरपेक्षिक अर्द्धत, %	काढीगृह वेगत, की.मी/मिनीक्कुर
1.3	32.8 – 34.8	24.8 – 25.5	65.6 – 84.1	00 - 06

बी. वरुन अनें त्रिवसनत्त कालावस्था मुनियिप्प

सूचीक	01-12-2021	02-12-2021	03-12-2021	04-12-2021	05-12-2021
मध, मी.मी	20	10	10	10	10
कुटीय तापमात्रा, °C	33	34	34	34	33
कुरत्त तापमात्रा, °C	25	24	24	24	23
कुटीय अरपेक्षिक अर्द्धत, %	84	84	84	84	84
कुरत्त अरपेक्षिक अर्द्धत, %	66	66	66	66	66
काढीगृह वेगत, की.मी/मिनीक्कुर	3	3	2	2	3
काढीगृह त्रिव, यिशि	200	200	180	200	230
मेल विन्यास, एक्टा	8	7	7	5	3

सी. कार्षिक निर्देशणात्मक

विष्णु	नव्वो	प्रश्नात्मक	कार्षिक निर्देशणात्मक
तीव्रत कुरत्ततेऱा अल्पक्कित सायारणा मुद्देया लडीक्कुम्			
पक्किसमयात्मक्कित कुटीय उष्णावुम् रात्रिक्कित कुरत्त ताप नियम्युम् अनुभवपेद्दुम्. उयर्नन अन्तर्क्ष अर्द्धतयुम् अनुभवपेद्दुम् वित्त, रम्पुर, कशुवण्डी, मत्तात्म, केकापे, एनीव वेयीलत्तिकुम्मक्कुन्नतु श्रवयेवाद चेय्युक वाफ पञ्चकरीक्कर एनीव ताञ्जुक्कर नम्मी संरक्षिक्कुक.			

നെല്ല്	വളർച്ചാ ഘട്ടം	ഓലപ്പുരുട്ടിപ്പുഴു 	മുളളുള്ള കന്ധു നെല്ലോലകൾക്കിടയിലൂടെ വലിച്ച് പുരുളുകൾ തുറക്കുക. തന്നെ വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണം കുടുതലായിരിക്കും. നെന്തജഞ്ഞൻ വളങ്ങൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കരുത്. ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ മാത്രം 'കൊറാജേജൻ' 3 മിലി പത്ര ലിറ്റർ വൈളളത്തിൽ എന്നതോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക.
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	കടചീയൻ	ഹൈക്സാകോണസോൾ 25 മിലി/25 ലിറ്റർ വൈളളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരാഴ്വു ശേഷം കുമ്മായം 2 കിലോ രൂപ തെങ്ങിന് എന്ന തോതിൽ നൽകുക. വീണ്ടും മുന്നാഴ്വു ശേഷം, പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പൊട്ടാഷ് 1 കിലോ രൂപ തെങ്ങിന് എന്ന തോതിൽ അധികമായി നൽകുക.
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	മഹാജ്ഞി	മുപ്പെട്ടതിയ തെങ്ങകൾ മുഴുവൻ പരിചെടുത്ത്, മാറ്റിയ ശേഷം, ഒരു ശതമാനം വീരുമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം കുലകളിലും ഇലകളിലും തജിച്ച് കൊടുക്കുക
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം	തടതുരപ്പൻ വണ്ട്	കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ശുചിത്വം പാലിക്കുക. അസുഖം ബാധിച്ച ചെടികൾ തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുക. ബുദ്ധവേറിയ ബന്ധിയാന എന്ന മിത്ര കുമിൾ 5 , 6 , 7 മാസങ്ങളിൽ ഒരു ലിറ്റർിന് 20 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ കലക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക
കാബേജ്	വിവിധ ഘട്ടം	ബ്ലൂക് റോട്ട്	കായ്‌ചു തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം എല്ലാ ആളുകളിലും 2% വീരുമുള്ള സുഡോമോണാസ് ലായൻ തജിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് രോഗ ബാധയെ ചെറുക്കണം സഹായിക്കും.
മുളക്	വളർച്ചാ ഘട്ടം	ഇലപ്പുള്ളി രോഗം	മാങ്കാസബ് അല്ലെങ്കിൽ സാഫ് രൂലിറ്റർ വൈളളത്തിൽ രണ്ടു ഗ്രാം വീതം എന്നതോതിൽ കലർത്തി തയ്യാറാക്കി തളിക്കുക

ഇളവൻ/ വെള്ളരി വർഗ്ഗ പച്ചകർികൾ	കായ പിടിക്കുന്ന എട്ട്	കായ ചീച്ചൽ 	രൈലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മിസ്റ്റിലിറ്റർ ട്രൂബക്കാണ്ടേസാൾ എന്നതോടിൽ കലർത്തി തയ്യാറാക്കിയ കുമിൾ നാശിനി തളിക്കുക
ജാതി	കായ പിടിക്കുന്ന എട്ട്	കായ/ഇലപുള്ളി രോഗം 	0.2% (രൈലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ രണ്ടു ഗ്രാം വീതം) പീരുമുള്ള കോഷൾ ഓൺ ക്ലോറോഫോറേറ്റ് ലായനി തളിക്കുക
ഹണ്ണി, മഞ്ഞൾ	വിവിധ എട്ട്	മുടുചീയൽ 	നീർവാർച്ച സാകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുക. ബോർഡോ മിശ്രിതം 1 % തടത്തിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക
കവുങ്ങ്	വിവിധ എട്ട്	കട ചീയൽ 	രൈലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ രണ്ടു മിസ്റ്റിലിറ്റർ ഷൈക്കുകാണ്ടേസാൾ എന്നതോടിൽ കലർത്തി തയ്യാറാക്കിയ കുമിൾ നാശിനി കവുങ്ങിൻ തടത്തിൽ കുതിർക്കുക .

ഒപ്പ്/-
 നോയൽ ഓഫീസർ
 ഗ്രാമീണ കൂഷ്ഠി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി