



**കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ, തൃശൂർ ജില്ല**  
**പ്രവചന കാലയളവ് 04.11.2023 മുതൽ 08.11.2023 വരെ**

വെള്ളാനിക്കർ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിലെ  
 കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗവും  
 ഭാരതീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത്



**എ എ എസ് ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 44/2023, (88) വെള്ളിയാഴ്ച** **തീയതി 03/11/2023**

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അനുഭവിച്ച കാലാവസ്ഥ (2023 ഒക്ടോബർ 28 മുതൽ നവംബർ 03 വരെ)							കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ		കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം (നവംബർ 04 മുതൽ നവംബർ 08 വരെ)				
28/10	29/10	30/10	31/10	01/11	02/11	03/11	തീയതി		04/11	05/11	06/11	07/11	08/11
0.0	0.0	24.6	7.0	49.6	2.2	9.1	മഴ (മില്ലിമീറ്റർ)		18	9	14	11	10
34.1	34.9	33.9	33.3	33.6	33.8	33.0	ഉയർന്ന താപനില (°C)		33	33	34	34	34
25.1	25.2	21.0	23.9	22.8	23.4	23.6	കുറഞ്ഞ താപനില (°C)		24	24	25	25	25
Partially Cloudy	Cloudy	Cloudy	Partially Cloudy	Partially Cloudy	Cloudy	Partially Cloudy	AM	മേഘ വ്യാപ്തി (ഒക്ടാ)	Overcast	Overcast	Overcast	Cloudy	Overcast
Cloudy	Cloudy	Overcast	Cloudy	Cloudy	Partially Cloudy	PM							
97	87	98	88	98	93	96	കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)		90	90	90	90	90
54	61	61	54	64	66		കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)		70	70	70	70	70
1.7	1.8	2.0	1.4	2.1	2.4	2.3	കാറ്റിന്റെ വേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)		3	5	4	4	5
C	E	C	C	C	C	C	AM	കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	WSW	WSW	W	WNW	W
NE	SW	NNE	NE	C	C	PM							
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ മഴ (മില്ലിമീറ്റർ)				01/01/2023 മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള മഴ (മില്ലിമീറ്റർ)				01/10/23 മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള മഴ (മില്ലിമീറ്റർ)					
92.5				1866.7				247.7					

**കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്പ്:** IMD യുടെ പ്രവചനപ്രകാരം ജില്ലയിൽ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട മഴയ്ക്കും, ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യത. കേരളത്തിൽ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.

**3. വിജ പരിപാലനത്തിനുള്ള പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങളും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും (Thirssur District)**

പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ: കാർഷികവിളകളിൽ രോഗകീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മണ്ണിന്റെ ഊർപ്പം സംരക്ഷിക്കാൻ ശരിയായ പുതയിടൽ രീതി അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നീർവാർച്ച സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുക.

വിളകൾ	രോഗ-കീടങ്ങൾ	കാർഷിക / മൃഗസംരക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല് മുണ്ടകൻ (ഞാറ്റുപരുവം)	-	ഞാറ് നട്ട് ഒരു മാസമായ പാടശേഖരങ്ങളിൽ ഒരു ഏക്കറിന് 100 കിലോഗ്രാം കുമ്മായം ഇടുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
തെങ്ങ്	-	തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ മണ്ണിന്റെ നനവ് നിലനിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി തടങ്ങളിൽ പച്ചയോ ഉണങ്ങിയതോ ആയ ചകിരി ഇട്ട് മൂടാവുന്നതാണ്. തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നു മീറ്റർ അകലത്തിൽ വരികൾക്കിടയിൽ ചാലു കീറിയോ, ഓരോ തെങ്ങിന്റെ കടക്കച്ചുറ്റം തടിയിൽ നിന്നും രണ്ടു മീറ്റർ അകലത്തിൽ വട്ടത്തിൽ ചാലുകൾ എടുത്തോ, അതിൽ ചകിരികൾ നിരത്തിയശേഷം മണ്ണിട്ട് മൂടാം. ചകിരിയുടെ കഴിഞ്ഞ ഉൾഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരത്തക്കവിധത്തിലാണ് ചകിരി ചാലുകളിൽ അടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനു മുകളിൽ മണ്ണിട്ട് മൂടണം.
ഇഞ്ചി	മുട്ടച്ചീയൽ	ഇഞ്ചിയിൽ മുട്ടച്ചീയൽ രോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ രോഗബാധിതമായ ചെടികൾ കിളിച്ചുമാറ്റി 2 ഗ്രാം കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി ഒഴിക്കുക. രോഗം വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ മൂന്ന് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബെഡിന് 15 ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും, 250 ഗ്രാം കുമ്മായവും കൂട്ടി കലർത്തി തടത്തിൽ ഇടുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
കരുമുളക്	പൊള്ളു രോഗം	കരുമുളക് ചെടികളിൽ പൊള്ളു രോഗം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായി തോട്ടത്തിൽ തണൽ ക്രമീകരിക്കുകയും, 1% വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. കൂടാതെ കാർബെന്റാസിഡും, മാങ്കോസെബും ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തളിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

മൃഗസംരക്ഷണം:- എലിപ്പനിക്കും ബാഹ്യപരാദങ്ങൾക്കും എതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. കാലിത്തീറ്റയിൽ പൂപ്പൽ വിഷബാധ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചാണക പരിശോധന നടത്തി വിദഗ്ദ്ധപദേശ പ്രകാരം വിര മരന്ന് നൽകുക. (CAADECCS KVASU, Mannuthy)