



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനിക്കര

Email: cohagmet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in

പരീക്ഷണാടിസ്ഥാന സ്നേഹക് തല കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ



വടക്കാഞ്ചേരി സ്നേഹക്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോട് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 10/2019(20), വൈള്ളിയാഴച്ച്

തീയതി 08.03.2019

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വൈള്ളാനികരയിൽ മഴ ലഭിച്ചില്ല. ഏറ്റവും ഉയർന്നതാപനില 33.4 മുതൽ 37.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാപനില 22.4 മുതൽ 25.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും, രാവിലെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത 70 മുതൽ 91 ശതമാനം വരെയും, ഉച്ചതെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത 36 മുതൽ 59 ശതമാനം വരെയും ആയിരുന്നു. കാറിന്റെ പേരഗത മണിക്കൂറിൽ 2.3 മുതൽ 4.1 കിലോമീറ്ററും, സുരൂ പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ദിനം പ്രതി 7.6 മുതൽ 9.8 മണിക്കൂറും, ബാഷ്പവീകരണം ദിനം പ്രതി 4.0 മുതൽ 5.3 മില്ലി.മീറ്റർ വരെയും ആയിരുന്നു.

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	09.03.2019	10.03.2019	11.03.2019	12.03.2019	13.03.2019
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	0	0	0	0	0
ഉയർന്ന താപനില (°C)	35	35	35	35	35
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	26	26	26	26	26
മോഖവുംപതി (കെട്ട)	4	5	6	4	4
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	80	80	80	80	80
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	60	60	60	60	60
കാറിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂറ്)	6	6	6	6	6
കാറിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	320	320	320	320	320

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ വരും 5 ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	വളർച്ചാവലക്ടം	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
തെങ്ങ്	പരിചരണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ	-	അന്തരീക്ഷഘടനയിൽ കുടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തടങ്ങളിൽ ഇല്ലപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനായി പച്ചയോ, ഉണങ്ങിയതോ ആയ ചകിരിയിട്ട് മുട്ടുനാൽ നല്ലതാണ്. തെങ്ങിന്റെ ചുവടിൽനിന്ന് മുന്നമീറ്റർ അകലെത്തിൽ വരികൾക്കിടയിൽ ചാലുകൊണ്ടോ, ഓരോ തെങ്ങിന്റെ കടയ്ക്കപ്പെട്ടും തടിയിൽനിന്നും രണ്ട്‌മീറ്റർ അകലെത്തിൽ വട്ടത്തിൽ ചാലുകളെടുത്തോ, അതിൽ ചകിരി നിരത്തിയ ശേഷം മൺഡുമുട്ടാം. ചകിരിയുടെ കുഴിഞ്ഞ ഉൾഭാഗം മുകളിലേയ്ക്ക് വരുത്തുവെച്ചതിലാണ് ചകിരി ചാലുകളിൽ അടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനുമുകളിൽ മൺഡുമുട്ടാണ്. ചകിരി അടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം 5–7 വർഷക്കാലം നിലനിൽക്കും. ചകിരിക്കുപകരം ചകിരിചേരാൻ തെങ്ങോന്നിന് 25കി.ഗ്രാം എന്നതോതിൽ ഓരോവർഷവും തടത്തില്ലെങ്കിലും മുട്ടുനാൽ ഇല്ലപ്പോൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉതകും.
വാഴ	-	ഇലപ്പുള്ളി രോഗം	ഇല പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയിൽ വാഴയിൽ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 20 ഗ്രാം സൃഷ്ടേയാമോണാൻ ഒരുലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കുളിർക്കേണ്ടതിലാണ്.
പച്ചമരികൾ (പയർ)	കായ്ക്കുന്ന പരുവം	കുരുടിപ്പ്	അന്തരീക്ഷഘടനയിൽ കുടിവരുന്നതിനാൽ പച്ചകരികളിൽ മണ്യൻ, ഇലപ്പുൾ, വൈള്ളിച്ച് മുതലായ നീരുറികുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾമുലമുള്ള കുരുടിപ്പുരോഗം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പത്ത് ഗ്രാം വർദ്ധിസിലിയം ഒരുലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണയാണുന്ന കീടനാശിനികൾ പത്തിവസം ഇടവിട്ട് തളിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
മുശ്രസംരക്ഷണം	കനുകാലിതൊഴുത്തിൽ വായുസമ്പര്കം കുടുമ്പതിന് വരുത്തുവരുത്തുവെച്ചുന്നതിനും പറ്റുമെങ്കിൽ മേൽക്കൂരയും ഉയരംകുടുമ്പതും നല്ലതാണ്. (സി.എ.എ.ഡി.ഐ.സി.സി.എസ്., കെ.വി.എ.എസ്.യു., മണ്ണംത്തി)		